

OENOLACTIC DIRECT

BACTERIA DE ADICIÓN DIRECTA

PRESENTACIÓN

Desde DOLMAR presentamos OENOLACTIC DIRECT, bacteria *Oenococcus Oeni* obtenida a partir de un específico sistema de producción que permite su adición de forma directa al depósito.

OENOLACTIC DIRECT se ha seleccionado por ser la bacteria óptima para trabajar con vinos tintos de alta gama. Consigue implantarse de forma rápida, obteniendo vinos con una menor pérdida de color. Destacable es su producción elevada de polisacáridos que confiere a los vinos una agradable sensación en boca haciéndolos más envolventes.

A estas características hay que sumarle el perfil aromático de los vinos dirigidos en su maloláctica con OENOLACTIC DIRECT, las notas varietales predominan sobre las lácticas, así como disminuyen los caracteres vegetales propios de uvas no muy maduras.

El control de producción de aminas biógenas es importante ya que OENOLACTIC DIRECT no presenta la enzima descarboxilasa, que cataliza el paso de aminoácidos a aminas biógenas.

Las indicaciones anteriormente expuestas corresponden a nuestros conocimientos actuales. Se facilitan sin compromiso ni garantía por nuestra parte en la medida que su utilización queda fuera de nuestro control. Estas informaciones no liberan al usuario del cumplimiento de la legislación y medidas de seguridad vigentes.

CONDICIONES DE UTILIZACIÓN

- Nivel de SO₂: el Total no podrá exceder de 50 mg/l y el Libre tendrá que ser inferior a 10 mg/l
- Azúcares residuales inferiores a 5 g/l
- pH superior a 3,2
- Temperatura óptima de trabajo: 16 a 20 °C.
- Grado alcohólico: < 13,5 % vol.
-

PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN

Disolver OENOLACTIC DIRECT en 20 veces su peso en agua sin cloro (agua mineral) a una temperatura de entre 20 y 25 °C.

Agitar y dejar hidratar durante 15 minutos.

Trascurrido este tiempo adicionar al depósito a tratar mediante un remontado sin aireación homogeneizando correctamente.

Mantener la temperatura del depósito entre 18 y 20°C.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Pueden conservarse durante 12 meses a 4 °C, o bien durante 18 meses a -18 °C.

Una vez abierto el envase, hay que usar la dosis inmediatamente.

PRESENTACIÓN

Dosis de 50, 100 y 250 hl.

